



آناهیل ۱۲۰۰

انتریک کوتد

عوارض جانبی:

مصرف خوراکی این فراورده در دوزهای توصیه شده ایمن است. ممکن است در برخی از افراد عوارضی مانند اسهال، نفخ، ناراحتی‌های گوارشی و سردرد مشاهده شود.

موارد احتیاط مصرف:

- مصرف این فراورده در افرادی که به بروملین، آناناس، لاتکس، رازیانه، کرفس، هویج، پاپائین و آرد گندم آلرژی دارند، توصیه نمی‌شود.
- در صورت مشاهده علائم واکنش حساسیتی، نظیر ضایعات پوستی وسیع و احساس تنگی نفس، فوراً به مرکز درمانی مراجعه شود.
- در صورت ابتلا به بیماری هموفیلی و یا اختلالات کبدی و کلیوی، پیش از مصرف این فراورده با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- در صورتی که از این فراورده استفاده می‌کنید و قصد انجام عمل جراحی دارید، حتماً پزشک جراح خود را از مصرف آن مطلع کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای ضدانعقاد خون (مانند وارفارین، آپیکسابان و ریپاروکسaban) یا ضدپلاکت (مانند آسپرین و کلوپیدوگرل)، پیش از مصرف این فراورده با پزشک معالج خود مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

به علت کافی نبودن مستندات علمی، مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر با تشخیص و تایید پزشک معالج.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته‌بندی:

هر قوطی حاوی ۳۰ عدد کپسول خوراکی به همراه برگ راهنما است.

دارنده پروانه ساخت:

شرکت داروسازی سلامت پرمون امین
ایران-تهران

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۷۷۲۲۰-۴
info@spameda.com
www.spameda.com



SPAMEDA

شکل دارویی: کپسول خوراکی انتریک کوتد

موارد مصرف:

ضدالتهاب و ضد درد

مواد مؤثره:

هر کپسول حاوی ۴۸۰ میلی‌گرم (معادل ۱۲۰۰ GDU) بروملین و ۷۵ میلی‌گرم کلسیم (به صورت کرینات) می‌باشد.

مواد جانبی:

کپسول سلولزی، میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پلی‌دی‌متیل سیلوکسان، منیزیم استارات

این محصول فاقد گلوتن، لاکتوز و شکر بوده و در تهیه آن از منابع گیاهی استفاده شده است.

مکانیسم اثر:

کپسول آناهیل ۱۲۰۰، به دلیل دارا بودن پوشش روده‌ای، از ماده مؤثره بروملین در برابر تخریب توسط اسید معده محافظت می‌کند. این ویژگی موجب افزایش پایداری بروملین، بهبود جذب و ارتقاء فراهمی زیستی آن در بدن می‌شود.

بروملین ترکیبی از آنزیم‌های پروتئولیتیک (هضم کننده پروتئین) است که از میوه یا ساقه آناناس (*Ananas comosus*) استخراج شده و دارای خواص درمانی متعددی می‌باشد.

بروملین با مهار تولید پروستاگلاندین‌ها و سایر فاکتورهای پیش‌التهابی و همچنین کاهش سطح برادی‌کینین پلاسما، به کاهش التهاب و درد کمک می‌کند. علاوه بر این، بروملین به دلیل داشتن خواص پروتئولیتیک و با افزایش فعالیت آنزیم کلاژناز، به ترمیم و بازسازی بافت آسیب‌دیده پوست کمک کرده و باعث تسریع روند بهبود زخم و جلوگیری از ایجاد اسکار می‌گردد.

براساس تحقیقات این شرکت و شواهد علمی، **کلسیم** موجود در این فراورده نقش مهمی در حفظ ساختار فضایی بروملین داشته و فعالیت پروتئولیتیک آن را چندین برابر افزایش می‌دهد.

مقدار مصرف:

روزانه یک تا دو بار، هر بار یک کپسول ترجیحاً یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود.



Anaheal¹²⁰⁰

Enteric Coated

Dosage Form: Enteric-coated oral capsule

Indications:

Anti-inflammatory and analgesic

Active Ingredients:

Each capsule contains:

Bromelain (2500 GDU/g)	480 mg (1200 GDU*)
Calcium (as carbonate)	75 mg

* GDU= Gelatin Digesting Unit

Other Ingredients:

Cellulose capsule, Microcrystalline Cellulose, Sodium Croscarmellose, Polycdimethylsiloxane, Magnesium Stearate

Gluten-free, Lactose-free, Sugar-Free and Vegetarian-Friendly.

Mechanism of Action:

Anaheal 1200 capsules protect the active ingredient, bromelain, from degradation by stomach acid. This protective feature enhances the stability of bromelain, improves its absorption, and increases its bioavailability.

Bromelain is a mixture of proteolytic enzymes derived from the fruit or stem of the pineapple (*Ananas comosus*), known for its various therapeutic properties.

Bromelain helps reduce inflammation and pain by inhibiting the production of prostaglandins and other pro-inflammatory factors, as well as decreasing plasma bradykinin levels. Additionally, due to its proteolytic properties and its ability to increase collagenase enzyme activity, bromelain aids in the repair and regeneration of damaged skin tissue, accelerating wound healing and preventing scar formation.

According to scientific evidence, the **calcium** in this product plays a crucial role in maintaining the spatial structure of bromelain and significantly enhances its proteolytic activity.

Directions for Use:

Take one capsule once or twice daily, preferably one hour before or two hours after meals.

Adverse Effects:

Oral consumption of this product at the recommended dosage is generally safe. However, some individuals may experience side effects such as diarrhea, flatulence, gastrointestinal upset, and headache.

Precautions:

- This product is not recommended for individuals allergic to bromelain, pineapple, latex, fennel, celery, carrot, papain and wheat flour.
- Seek medical help immediately if you experience symptoms of an allergic reaction, such as generalized skin rashes or breathing difficulties.
- If you have hemophilia or any liver or kidney disorders, consult your physician before using this product.
- If you are using this product and plan to undergo surgery, be sure to inform your surgeon.

Drug Interactions:

If you are taking anticoagulant medications (such as warfarin, apixaban, or rivaroxaban) or antiplatelet agents (such as aspirin or clopidogrel), consult your physician before using this product.

Pregnancy and Lactation:

Due to insufficient scientific evidence, this product is not recommended for use during pregnancy or lactation unless under medical supervision.

Storage:

Store below 25°C. Keep in a dry place, away from moisture and direct sunlight. Keep out of reach of children.

Packaging:

Each container includes 30 oral capsules along with a patient information leaflet.

References:

- 1- <https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com>
- 2- PDR for Herbal Medicines, 4th Edition

MAH:
Salamat Parmoon Amin Pharmaceutical Co.
Tehran, Iran

Tel: (+98-21) 88377220-4
info@spameda.com
www.spameda.com



SPAMEDA